

# Wondbehandelingsprotocol Soest

## FIXATIEMATERIAAL EN PLEISTERS

### Elastisch hydrofiel windsel:

- voor fixatie van wondbedekkers.

### Zelfklevende fixatie:

#### Fixomull stretch:

- speciaal voor fixatie op lichaamsronningen.

### Ideaalwindsel:

- geeft lichte steun.
- bijzonder geschikt bij verstuikingen en spierblessures.

### Netverband:

- voor fixatie van verband op arm, been en buik.

### Elastisch buisverband: Tubifast:

- fixeert diverse verbanden.
- meet de omvang van het breedste gedeelte voor de juiste maat.

### Steriele eilandpleister: Cutiplast

## GAZEN EN ABSORBEREND VERBAND

### Onsteriel of steriel kompres non-woven: Cutisoft:

- ook verkrijgbaar als 4 lagen steriel splitkompres.

### Absorberend verband steriel: Cutisorb:

- neemt veel wondvocht op.
- is luchtdoorlatend.

## MODERNE WONDVERZORGINGSMATERIALEN

### Alginaat: Cutimed Alginate:

- zorgt voor een vochtig wondmilieu.
- aanbrengen binnen de wondranden.
- ook verkrijgbaar in streng.

### Foam verband: Allevyn Gentle:

- border is met plakrand.
- siliconen contact laag.
- alleen inzetten wanneer het verband 3 dagen kan blijven zitten.
- creëert een vochtig wondmilieu.
- ook verkrijgbaar in hiel kompres en multisite.
- **met** plakrand (border) kan men kort douchen.
- onder zwachtels **zonder** border gebruiken.

### Foamverband stuit: Mepilex border sacrum:

zie beschrijving Allevyn Gentle

### Hydrofiber: Aquacel:

- zorgt voor een vochtig wondmilieu.
- beschermt wondranden.
- kan veel vocht absorberen.
- houdt vocht vast onder druk.
- minimaal 1½ cm over wondranden aanbrengen.

### Enzym alginogel: Flaminal hydro:

- creëert een vochtig wondmilieu.
- afdekken met Cuticerin om de Flaminal te fixeren.
- ½ cm dik en op de wondranden aanbrengen.
- afdekken met absorberend verband of foamverband.
- wanneer Flaminal vervloeit is dan vervangen: gem. 2x per week.

### Niet verklevend synthetisch zalfkompres:

#### Cuticerin:

- iedere 2 tot 3 dagen vervangen

### Niet verklevend siliconen gaas: Mepitel One:

- bijzonder geschikt voor de kwetsbare huid.
- wordt over de wondranden aangebracht.
- zie verder skin tears.
- 1x per 3-7 dagen verwisselen.

## OVERIGE MATERIALEN

### Zink Oxide olie:

- beschermt de wondranden.
- verwijderen met zoete olie alvorens een nieuw laagje aan te brengen.

### Polsterverband: Soffban

### Zwachtels korte rek: Comprillan elastisch windsel

### Twee laags zwachtelsysteem lange rek: Coban:

- dun zwachtelsysteem.
- voor 1-malig gebruik.
- alleen geschikt bij verbandwissel 1-2 x per week.

### NaCl 0,9% flacon spoelvoelstof.

### Catheter: Ch.16, ongecoat:

- voor spoelen van diepe wonden.

### Voedingsspuit:

- voor spoelen wonden
- past op de catheter, Ch.16.

### Onderleggers

## ALTERNATIEVEN

### Hydrocolloïd: Cutimed Hydro:

- creëert een vochtig wondmilieu.
- kan kort mee gedoucht worden.

### Hydrofiber: Aquacel AG: zie Aquacel

### Foam verband met hydrofiber: Aquacel foamverband adhesive:

- foamverband border met aquacel.
- kan iets meer vocht aan als een gewoon foamverband.

### Foamverband: Allevyn Gentle multisite:

- speciaal voor afdekken op rondingen.

### Transparante wondfolie: Leucomed-T:

- kan kort mee gedoucht worden.
- 1x per 2 dagen verwisselen.

### Siliconen hechtpleister: Mepitac fixatietape:

- voor mensen die allergisch zijn voor gewone pleisters.

### Fixeren en verbinden: Hekahaft:

- let op niet te strak trekken bij verbinden.

### Enzym alginogel: (meer alginaat) Flaminal forte:

- zie Flaminal hydro.
- gebruiken bij zeer natte gele/zwarte wonden.

### Super absorberend verband steriel: Vliwasorb:

- verkleeft niet aan de wond.

### Spoelvoelstof: Prontosan:

- gazen in drenken, 10 minuten laten inwerken.
- bij zeer geïnfecteerde wonden.

### Dubbellaags compressiekous: Venatrain:

- bestaat uit een verbandkous om het verband te fixeren. Eروerheen een compressiekous die alleen overdag gedragen wordt. Samen 40 mm Hg. Kan ook geleverd worden via verwijkskaart aanvraag verbandkous via Hilhorst Hulpmiddelen of andere organisatie die kousen aanmeet.

### Oogzalf: Terra Cortril:

- tegen hypergranulatie (wild vlees).
- 2-3 keer per week aanbrengen afhankelijk van de verbandwissel.

## BIJ VRAGEN OVER DE WONDBEHANDELING:

Raadpleeg de betreffende HUISARTS of

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE WONDZORG of

SPECIALISTISCH VERPLEEGKUNDIGE WONDZORG VAN DE THUISZORGORGANISATIES.